



## Vejledning til vaccination af kyllinger med spray i huset

### Inden vaccination

- Inden vaccination med spray foretages en "test spray" for at se hvor meget vand der skal til for, at du kan nå igennem hele huset med vaccineblandingen.
- Hvis kyllingerne er i et mindre område eller i kasser ved ankomst, er tommelfingerreglen: 0,5 liter – 1 liter vand pr. 1000 kyllinger (1000 doser) som vaccinen blandes op i.
- Rygsprøjteudstyret sikres at det er rent, har strøm på batteriet og at det er den korrekte dyse der anvendes til vaccinen.
- Tjek at huset er klar til vaccination: lys, ventilation og temperatur.

### Blanding af vaccine:(Umiddelbart inden vaccination)

- Fjern metalhætten fra vaccineglassene.
- Vask hænderne og brug gerne handsker.
- Brug en ren beholder til stamopløsningen f. eks en plastik spand der ikke bruges til andet.
- Læg den beregnede mængde af vaccineglas ned i den beregnede mængde vand
- Åbn vaccineglasset under vand. Der er undertryk i glasset, så vandet vil strømme ind. Herefter fyldes glasset atter med vand og rystes, så alt pulver er ude af hætteglasset.
- Vaccineblandingen hældes på rygsprøjten og du er klar til vaccination
- Efter 2 timer vil vaccinen ikke længere være levedygtig efter opblanding i vand, derfor er det vigtigt kun at blande til 2 timers forbrug.

**Husk at skrue op for lys, ventilation og temperatur igen efter vaccination**